OSO® 5%SC FUNGICIDE

FICHA TÈCNICA

Proveedor :
CERTIS USA LLC .
9145 Guilford Road , Suite 175
Columbia , Maryland 21046, USA

Distribuido por :
CERTIS AGRO MEXICO SRL DE CV
Bosque de Ciruelos 180
Col. Bosques de las Lomas , 11700 , Cd de Mex.
Tel. 800 255-3924

Teléfono de Emergencias: (55) 5598-6659 / (55) 5611-2634 Lada sin costo 800-00-928-00

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre Comercial	**OSO 5% SC FUNGICIDE**
Ingrediente Activo	Polyoxin D Sal de Zinc
Grupo Químico	Fungicida
Tipo de Producto	Fungicida
Usos identificados	Fungicida Agrícola
Formulación	Suspensión Concentrada
Concentración	5.0 %
Equivalente en Gramos	52.5 gramos / Litro
Ingredientes Inertes	Emulsificantes y Diluyentes
Registro COFEPRIS	RSCO-FUNG-0302H-X0657-064-5.0

PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS

Apariencia	Lìquido de color café con sòlidos suspendidos
Olor:	Similar al de el aceite vegetal
Punto de Fusión	No Determinado
Presión del Vapor:	No Aplicable
Volatilidad por volumen:	No es Volàtil
Densidad:	No Disponible
Solubilidad:	1.05 g/ ml @ 22 Grados centigrados
Temperatura de Descomposición:	No Determinado

USOS : FUNGICIDA DE ORIGEN NATURAL PARA USO AGRICOLA

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. Agite el producto antes de usar , abra el envase girando la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj y agregue al tanque del equipo de aspersion la dosis recomendada de **OSO 5% SC FUNGICIDE** , posteriormente complete el llenado, haciendo una pequeña agitación sin dejar que la mezcla repose. Asegurese de hacer una buena calibración de su equipo para aplicar la dosis correcta. Debe ser mezclado con agua . Se puede aplicar de aplicación terrestre en aspersión. Utilice el equipo de proteccion indicado bajo la leyenda “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO” antes de comenzar a manipular el producto.

CONTRAINDICACIONES. No aplicar cuando la velocidad del viento favorezca la deriva más allá del área prevista para el tratamiento.

FITOTOXICIDAD. Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.

COMPATIBILIDAD. Observe todas las precauciones y limitaciones en la etiqueta de cada producto por separado. Si se desea mezclar, se debe realizar una “prueba de jarra” previa a su aplicación, para evitar efectos de incompatibilidad

RECOMENDACIONES DE USO

INFORMACIÓN GENERAL. OSO 5% SC FUNGICIDE:

INFORMACIÓN GENERAL. OSO 5% SC FUNGICIDE , Actúa como un fungistático deteniendo el crecimiento del hongo. Se recomienda como tratamiento curativo al detectar los primeros síntomas y para prevenir niveles altos de incidencia y/o severidad de las enfermedades descritas en cuadro de recomendaciones de esta etiqueta.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS mL/ha	RECOMENDACIONES DE USO
Jitomate Berenjena Chile Tomate verde Papa Pimiento morrón (0)	Cenicilla *(Leveillula taurica)*	**400-700**	Realizar tres aplicaciones foliares a intervalos de 7 dias , iniciar cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad . Usar en mezcla de tanque un coadyuvante no iònico tipo penetrante , dispersante, humectante , a dosis recomendada en su etiqueta. Volumen de aplicación sugerido : 550-650 L de agua / Ha.
Vid (0)	cenicilla *(Uncinula necator)*	**400-700**	Realizar tres aplicaciones foliares a intervalos de 7 dias , iniciar cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad . Usar en mezcla de tanque un coadyuvantes , a dosis recomendada en su etiqueta. Volumen de aplicación sugerido : 550-650 L de agua / Ha.
Pepino Melón Calabaza Calabacita Sandía Chayote (0)	Cenicilla *(Sphaerotheca fuliginea)*	**400-700**	Realizar tres aplicaciones foliares a intervalos de 7 dias , iniciar cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad . Usar en mezcla de tanque un coadyuvantes no iònico tipo penetrante , dispersante, humectante , a dosis recomendada en su etiqueta. Volumen de aplicación sugerido : 450-650 L de agua / Ha.
Fresa, Zarzamora, Arándano, Frambuesa, Vid. (0)	*Moho gris* *(Botrytis cinerea)*	**600-1000**	Realizar tres aplicaciones foliares a intervalos de 7 dias , iniciar cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad . Usar en mezcla de tanque un coadyuvantes no iònico tipo penetrante , dispersante, humectante , a dosis recomendada en su etiqueta. Volumen de aplicación sugerido : 300-400 L de agua / Ha.

( ) Intervalo de Seguridad: Días entre la última aplicación y la cosecha del cultivo.

Tiempo de reentrada: 4 horas

Intervalo y Època de aplicación : Use las dòsis altas para una mayor presion del patogeno. Repita las aplicaciones a intervalos de 6 – 7 dias , Si es necesario reducir el intervalo de las aplicaciones en las dos primera aplicaciones . Apliquese con el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura. El producto puede ser aplicado con equipo convencional.

MEDIDAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS,RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS."

- "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT."

- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)."

- "EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO"

- "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUEEN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN."

GARANTIA

Certis Agro Mexico S. de R.L. de CV. garantiza la composiciòn del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. En caso de que dicha composiciòn variase notablemente por causas imputables a CERTIS AGRO MÉXICO, S. de R.L. de C.V., esta reembolsarà el importe pagado por el producto. Por ningùn motivo CERTIS AGRO MÉXICO, S. de R.L. de C.V., asume responsabilidad por el mal uso y manejo del producto ni por los da.os que por ello se pudiesen ocasionar.



¡! Poderoso Fungicida

de Origen natural Con novedoso modo de acciòn ¡!

Certis USA , Distribuido en Mexico por Certis Agro Mexico.

Actualizacion : Enero del 2026.